

## 12-Дәріс

**Тақырыбы:** Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері. Функция графигінің ойыс, дөңес аралықтары. Иілу нүктелері.

**Функциялардың кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері**

$[a, b]$  кесіндісінде үзіліссіз  $f$  функциясының ең үлкен (ең кіші) мәнін табу керек болсын. Оның қандай да бір  $x_0 \in [a, b]$  нүктесінде болатыны белгілі.

Ендеше тек келесі үш жағдай болуы мүмкін:

$$1) x_0 = a, \quad 2) x_0 = b, \quad 3) x_0 \in (a, b).$$

Егер  $x_0 \in (a, b)$  болса, онда  $x_0$  – локальді экстремум нүктесі екені түсінікті.

Егер  $x_1, x_2, \dots, x_m$  - күдікті нүктелер, онда

$$\begin{aligned} \max_{x \in [a, b]} f(x) &= \max \{ f(a), f(b), f(x_1), \dots, f(x_m) \} \\ \min_{x \in [a, b]} f(x) &= \min \{ f(a), f(b), f(x_1), \dots, f(x_m) \}. \end{aligned} \quad (3)$$

**Функцияның дөңестігі. Иілу нүктелері**

$f(x)$  функциясы  $J$  – аралығында берілсін.

**Анықтама.** Егер  $f(x)$  – тің графигінің кез келген  $A_1(x_1, f(x_1))$  және  $A_2(x_2, f(x_2))$  екі нүктесінің арасындағы доға осы доғаны керетін хордадан жоғары жатпаса, онда  $f(x)$  – функциясы  $J$  аралығында **дөңестігі төмен бағытталған**, қысқаша, **ойыс функция** деп аталады.

Егер  $g(x) = -f(x)$  функциясы  $J$  аралығында ойыс болса, онда  $f(x)$  – функциясы  $J$  аралығында **дөңестігі жоғары бағытталған**, қысқаша **дөңес функция** деп аталады. Әрине  $f(x)$  ойыс функция болса, онда  $-f(x)$  дөңес болады.

**Теорема-1.** Егер  $f(x)$  функциясының  $J$  аралығында туындысы бар болса, онда  $f(x)$  **ойыс (дөңес)** функция болу үшін  $f'(x)$  функциясы аралығында **кемімейтін (өспейтін)** функция болуы қажетті және жеткілікті.

$f(x)$  функциясының  $J$  аралығында екінші ретті туындысы бар болса, онда  $f'(x)$  функциясы  $J$  аралығында кемімейтін (өспейтін) болуы  $x \in J, f'(x) \geq 0$  ( $x \in I, f'(x) \leq 0$ ) шарттарымен пара-пар болғандықтан, келесі теоремаға келеміз.

**Теорема-2.** Егер  $J$  аралығында  $f(x)$  функциясының екінші ретті туындысы бар болса, онда  $f(x)$  **ойыс (дөңес) функция** болуы үшін әрбір  $x \in J$  үшін  $f'(x) \geq 0$  ( $f'(x) \leq 0$ ) теңсіздігі орындалуы қажетті және жеткілікті.

Ойыс (дөңес) функциялардың геометриялық сипаты келесі теоремадан көрінеді.

**Теорема.**  $f(x)$   $(a,b)$  - аралығында дифференциалданатын функция болса, онда  $f(x)$  - **ойыс (дөңес) функция** болуы үшін, оның графигі өзінің әрбір жанамасынан **төмен (жоғары) жатпауы** қажетті және жеткілікті.

**Анықтама.**  $f(x)$  функциясы  $(a,b)$  аралығында анықталған және үзіліссіз болсын. Егер  $x_0 \in (a,b)$  нүктесінің белгілі бір оң және сол жақты маңайларында  $f(x)$  функциясының дөңестігі қарама-қарсы бағытталған болса, онда  $(x_0, f(x_0))$  нүктесі  $f(x)$  - тің графигінің **иілу нүктесі** деп аталады.

**Теорема-3 (иілу нүктесінің қажетті шарты).**  $(a,b)$  аралығында  $f(x)$  дифференциалданатын, ал  $x_0$  - нүктесінде екінші ретті туындысы  $f'(x_0)$  бар функция болсын. Егер  $(x_0, f(x_0))$  иілу нүктесі болса, онда  $f'(x_0) = 0$ .

**Теорема-4 (иілу нүктесінің жеткілікті шарты).** Егер  $f(x)$  функциясы  $x_0$  нүктесінің белгілі бір  $\delta$  - маңайында үзіліссіз болып,  $(x_0 - \delta, x_0)$  аралығында туындысы бар және ол кемімейтін (өспейтін),  $(x_0, x_0 + \delta)$  аралығында туындысы бар және ол өспейтін (кемімейтін) болса, онда  $(x_0, f(x_0))$  - иілу нүктесі.

Басқаша айтқанда,  $(x -$  өсу бағытында)  $x_0$  - нүктесінен өткенде  $f'(x)$  - екінші ретті туындының таңбасы өзгерсе, онда  $(x_0, f(x_0))$  - иілу нүктесі болады.

Сонымен, функцияның иілу нүктелерін тек қана  $f'(x_0) = 0$  орындалатын немесе  $f'(x)$  - болмайтын нүктелердің (ондай нүктелерді **функцияның екінші ретті күдікті нүктелері** деп те атайды) ішінен іздеу керек.